

Curacid® Curaman Plus – Vollviruzide Händedesinfektion mit Rückfettern

Alkoholisches Händedesinfektionsmittel mit kurzer Einwirkzeit zur hygienischen Händedesinfektion. **Curacid® Curaman Plus** ist hochwirksam gegen Viren und zeichnet sich durch eine sehr gute Hautverträglichkeit aus.

Der hohe Anteil an Ethanol ermöglicht auch eine gute Wirksamkeit gegen Noro-Viren in kurzer, praxistauglicher Zeit.

Curacid® Curaman Plus ist anwendbar in allen Bereichen der menschlichen Hygiene.

Wirksame Bestandteile in 100g

73,5g Ethanol

sonstige Bestandteile: gereinigtes Wasser, Rückfetter, Tenside

Anwendungsgebiete

Hygienische Händedesinfektion. Geeignet für alle Bereiche zur menschlichen Hygiene mit hohen Anforderungen an die Händehygiene in Kliniken, Praxen, Pflegeeinrichtungen sowie in Industrie und Labor.

Wirkungsspektrum/Begutachtung

- bakterizide und fungizide Wirkung nach EN 1500 entsprechend der Anwendungsempfehlung der VAH, 15 Sekunden/mind. 3 ml
- Viruzid wirksam nach EN 14476, auch gegen Noro-, Adeno, und Polioviren
- RKI, Wirkungsbereich A
- begutachtet u. a. auch nach den Richtlinien der VAH
- inkl. MRSA, HIV/HBV/HCV
- Hygienische Händedesinfektion nach EN 1500

Dosierung und Anwendung

Zur hygienischen Händedesinfektion werden 3 ml in die hohle Handfläche gegeben und sofort mind. 15 Sekunden intensiv mit beiden Händen so verreiben, dass die Hände vollständig benetzt werden. Es ist zu beachten, dass immer auch alle Fingerzwischenräume, Fingernagelfalze und Hautfalten vollständig und über die gesamte Einwirkzeit benetzt werden. Nach Ablauf der Einwirkzeit ist die Desinfektion abgeschlossen.

Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z.B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut) ist die Einwirkzeit zu verlängern.

Einwirkzeiten:

| | |
|-------------------------------|---------|
| Hygienische Händedesinfektion | |
| gem. VAH | 15 Sek. |
| RKI (Wirkungsbereich A) | 30 Sek. |
| Adeno | 60 Sek. |
| Polio | 2 Min. |
| BVDV | 15 Sek. |
| SV40 | 60 Sek. |
| Noro | 15 Sek. |
| Rota | 15 Sek. |
| Vaccinia | 15 Sek. |
| TB | 30 Sek. |
| MRSA | 15 Sek. |

Curacid® Curaman Plus ist gemäß RKI als vollviruzid einzustufen.

Vermeidung von Anwendungsfehlern

Stark verschmutzte Hände sollten vor der Desinfektion mit Wasser und Seife gereinigt werden. Nasse Hände vor der Desinfektion erst trocknen lassen. **Curacid® Curaman Plus** ist nicht zur Desinfektion offener Wunden geeignet.

Warnhinweise

Nur zur äußeren Anwendung. Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen lagern. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen.

Lieferformen

| | |
|------------------------|---------------------|
| Art.-Nr.: 10150 | 100ml Kittelflasche |
| Art.-Nr.: 10151 | 500ml Flasche |
| Art.-Nr.: 10152 | 1000ml Flasche |
| Art.-Nr.: 10153 | 5L Kanister |

